



Recommandations pour les vaccinations chez les petits animaux 2024

COMPLEMENTS AUX RECOMMANDATIONS POUR LES VACCINATION DE L'ASMPA 2022

Mars 2024

REMARQUE GÉNÉRALE EN CAS DE DISPONIBILITÉ LIMITÉE DES VACCINS

Il convient de donner la priorité à une vaccination efficace et complète des jeunes animaux et, si nécessaire, d'accepter de retarder le rappel de vaccination des animaux adultes - déjà bien immunisés.

Les recommandations suivantes concernent les vaccins de base (virus herpès félin, virus calici félin, panleucopénie (RCP/CRP)) et la vaccination contre le virus leucémogène (FeLV) chez le chat. Les recommandations sont largement basées sur l'opinion d'experts (Commission de vaccination de la Suisse en consultation avec le European Advisory Board on Cat Diseases) ; il ne s'agit pas de déclarations institutionnelles officielles. Pour la vaccination contre la rage, les exigences légales pour le passage de la frontière s'appliquent.

Terminologie : L'immunisation de base est l'immunisation d'un organisme par une ou plusieurs vaccinations qui entraînent une immunité solide, c'est-à-dire qui sont nécessaires à l'établissement d'une protection immunitaire durable. En règle générale, cela comprend au moins deux vaccinations à des

intervalles de 3 à 4 semaines. Pour les premières vaccinations des chatons, cela comprend les vaccinations jusqu'à l'âge de 16 semaines ainsi qu'une vaccination à l'âge de 6 à 12 mois (voir aussi les recommandations de vaccination de l'ASMPA¹).

QUE FAUT-IL PRENDRE EN COMPTE LORS DU CHANGEMENT DE VACCIN CHEZ LE CHAT ADULTE ?

Changement de Feligen CRP/CR ou Nobivac Tricat III /Ducat à Purevax RCP/RC

- **Recommandation** : Deux vaccinations (renouvellement de l'immunisation de base)
- **Raison** : Concernant le FCV il y a un changement d'un vaccin vivant-atténué à un vaccin mort, ainsi qu'un changement des antigènes (FCV F9 à FCV G1/431), donc une nouvelle immunisation de base est recommandée.



Changement de Purevax RCP/RC à Feligen CRP/CR ou Nobivac Tricat III/Ducat

- **Recommandation** : une seule vaccination est suffisante
- **Raison** : la partie FCV est un passage d'un vaccin mort à un vaccin vivant-atténué chez un chat adulte (ayant eu une immunisation de base ; système immunitaire mature), donc une seule vaccination est suffisante.

Changement de Feligen CRP/CR à Nobivac Tricat III/Ducat ou vice versa.

- **Recommandation** : ces deux vaccins sont interchangeables si nécessaire (pas de répétition de l'immunisation de base).
- **Raison** : Les deux vaccins ont une composition similaire (composants antigéniquement similaires) et une immunité croisée devrait se produire.

Changement du FeLV Leucogen au FeLV Purevax ou vice versa

- **Recommandation** : une vaccination (pas de répétition de l'immunisation de base).
A noter : Des vaccinations répétées sont recommandées chaque année jusqu'à l'âge de 4 ans chez les chats à risque d'exposition ; par la suite, l'intervalle de vaccination peut être porté à 2 ou 3 ans si le risque d'infection est modéré ou faible¹.
- **Raison** : Les deux vaccins contiennent des composants antigéniquement similaires et une immunité croisée devrait se produire.

Considérations générales sur la répétition de la vaccination avec les vaccins de base (RCP) et le FeLV

Vérifiez quel est le risque individuel d'infection pour le chat. Par exemple : foyer à plusieurs

chats (risque accru de contracter le FCV), chat ayant un accès à l'extérieur (possibilité d'infection par le FeLV). Les chats ne doivent être vaccinés qu'aussi souvent que nécessaire (tenez compte de la durée de l'immunité, voir les recommandations de vaccination SVK-ASMPA¹).

QUE FAUT-IL PRENDRE EN COMPTE LORS DU CHANGEMENT DE VACCIN PENDANT LA VACCINATION DE BASE DU JEUNE CHAT ?

Changement de Feligen CRP/CR ou Nobivac Tricat III/Ducat à Purevax RCP/RC

- **Recommandation** : Renouvellement de la vaccination de base recommandé (au moins 2 vaccinations à intervalles de 3 à 4 semaines avec le même vaccin).
- **Raison** : Le composant FCV est un passage d'un vaccin vivant-atténué à un vaccin mort, ainsi qu'un changement d'antigènes (FCV F9 à FCV G1/431), une nouvelle immunisation de base est donc recommandée.

Changement de Purevax RCP/RC à Feligen CRP/CR ou Nobivac Tricat III/Ducat

- **Recommandation** : Renouvellement de l'immunisation de base recommandé (au moins 2 vaccinations à intervalles de 3 à 4 semaines avec le même vaccin).
- **Raison** : La partie FCV est un changement d'antigènes (FCV G1/431 à FCV F9), une nouvelle immunisation de base est donc recommandée.



Changement de Feligen CRP/CR à Nobivac Tricat III/Ducat ou vice versa

- **Recommandation** : ces deux vaccins sont interchangeables, si nécessaire, même pendant la vaccination de base.
- **Raison** : Les deux vaccins ont une composition similaire (composants antigéniques similaires) et une immunité croisée devrait se produire.

Changement de FeLV Leucogen au Purevax FeLV ou vice versa.

- **Recommandation** : Il est recommandé de répéter la vaccination de base (au moins 2 vaccinations dans un intervalle de 3 à 4 semaines avec le même vaccin).
- **Raison** : Bien que les deux vaccins contiennent des composants antigéniquement similaires, il convient de procéder à une nouvelle vaccination de base pour des raisons de sécurité et surtout chez les jeunes chats, qui sont particulièrement sensibles au FeLV.

QUELLE PEUT ÊTRE LA DURÉE DE L'INTERVALLE DE TEMPS PENDANT LA VACCINATION DE BASE ?

La première vaccination doit être effectuée aussi tôt que nécessaire chez les jeunes chats.

- **Standard**: 8 semaines (Purevax RCP, Feligen CRP ou Tricat III) ; si nécessaire à partir de 6 semaines (Nobivac Tricat III peut être administré dès l'âge de 6 semaines).
- **Intervalle** entre la deuxième vaccination et les vaccinations suivantes en général pour

l'immunisation de base : il faut respecter généralement les prescriptions d'homologation des fabricants et les recommandations de vaccination de la SVK-ASMPA1. Si cela n'est pas possible pour une raison quelconque, les recommandations suivantes s'appliquent à l'intervalle de vaccination pour l'immunisation de base :

- Minimum : 2 semaines
- Optimal : 2 – 3 ou 3 – 4 semaines (selon le vaccin: respecter les règles d'homologation)
- Suboptimal : 5 – 6 semaines
- trop tard : > 6 semaines ; dans ce cas, une nouvelle vaccination de base doit être effectuée (2 vaccinations à des intervalles de 3 – 4 semaines).

Référencé :

<https://www.svk-asmpa.ch/images/pdf/veterinaire/recommandations-vaccination-svk-asmpa.pdf>

Pour la Commission Permanente de Vaccination de l'ASMPA :

PROF DR. MED. VET.
Regina Hofmann-Lehmann
PD DR. MED. VET.
Barbara Willi, Vetsuisse-Fakultät Zürich
DR. MED. VET.
Flurin Tschuor, Oftringen
DR. MED. VET.
Claudia Nett, vetderm.ch, Hünenberg

A titre consultatif :

DR. MED. VET.
Hanspeter Ottiger
DR. MED. VET.
Anna Eichrodt, IVI.